


Casa di Cura Ambrosiana Spa	 Regione Lombardia Sistema Sanitario	Modulo	Versione	Data	Documento di riferimento
		431	02	22/05/2017	
PREPARAZIONE PER TEST BRONCODINAMICO ALLA METACOLINA					

Il presente documento si riferisce alla preparazione per la **Prova broncodinamica (Test alla Metacolina)**. I pazienti che devono effettuare un test di provocazione bronchiale aspecifico devono sospendere l'assunzione dei seguenti farmaci che possono influire sul risultato dell'esame:

- **CORTICOSTEROIDI SPRAY** (Clenil; Becotide; Flixotide; Pulmaxan; ecc...) quattro giorni prima dell'esame;
- **TEOFILLINICI** (Theodur; Aminomal; Briofil; Diffimal; ecc...) 48 ore prima;
- **BETA 2 STIMOLANTI** a breve durata di azione (Ventolin; Dosberotec; ecc...) 12 ore prima;
- **BETA 2 STIMOLANTI** a lunga durata di azione, anche associati a Corticosteroidi (Serevent; Oxis; Symbicort; ecc...); 48 ore prima;
- **IPRATROPIO BROMURO** da solo o associato a Salbutamolo (Atem; Breva; ecc...) 24 ore prima;
- **ANTILEUCOTRIENI** (Singulair; Montegen; Lunkasma, ecc...) 24 ore prima;
- **CROMONI** (Lomuspray; Tilade; ecc...) 48 ore prima;
- **ANTISTAMINICI** (Zirtec; Atarax; Formistin; ecc...) 3 giorni prima;
- **TÈ, CAFFÈ, BEVANDE CONTENENTI CAFFEINA** (Coca cola e simili) dalla sera prima dell'esame;
- **INOLTRE NON DEVONO AVERE AVUTO ACCESSI ASMATICI GRAVI O RIACUTIZZAZIONI BRONCHITICHE NELLE TRE SETTIMANE PRECEDENTI LA PROVA.**

Le informazioni riportate in questo modulo sono validate dal Servizio di Allergologia.
Per dubbi ed informazioni chiamare il seguente numero: 02.4587.6607-6609